

# Bepanthol®



## Colirio

Colirio con hialuronato de sodio al 0,15 % y dexpanthenol al 2 %

### DESCRIPCIÓN

**Bepanthol® Colirio** forma una capa protectora transparente, estéril, sin conservantes y viscoelástica en la córnea. **Bepanthol® Colirio** contiene hialuronato de sodio, sal de sodio del ácido hialurónico. Gracias a sus propiedades físicas, forma una película protectora homogénea, estable y que permanece durante un periodo prolongado en la capa epitelial ocular, sin alterar la visión. **Bepanthol® Colirio** contiene también provitamina B5 (dexpanthenol), capaz de fijar gran cantidad de agua, hidratar y cuidar el ojo, además de favorecer las propiedades hidratantes del hialuronato de sodio. La combinación del hialuronato de sodio (estabilizador de la película lagrimal) y el dexpanthenol (nutritivo, calmante) protege, hidrata y lubrica la superficie ocular.

Como resultado, **Bepanthol® Colirio** proporciona un alivio prolongado de las molestias asociadas a:

- estrés mecánico, como el causado por las lentillas de contacto duras o blandas, o por procedimientos diagnósticos oftalmológicos;
- estrés ambiental, como el inducido por aires acondicionados, viento, frío, sequedad o aire contaminado, por ejemplo, por el humo del tabaco;
- estrés visual por el esfuerzo ocular intensivo, como por ejemplo, frente a ordenadores, microscopios o durante el uso prolongado de vehículos motores.

**Bepanthol® Colirio** no contiene conservantes y es bien tolerado en un uso a largo plazo. **Bepanthol® Colirio** es compatible con el uso de lentes de contacto.

### MODO DE EMPLEO

Separar un envase monodosis. Comprobar que el envase no está dañado. Para abrir las monodosis, girar el extremo superior plano (sin tirar de él). Inclinar la cabeza ligeramente atrás, mirar hacia arriba, bajar suavemente el párpado inferior y aplicar una gota en el ojo o en la superficie interna de la lentilla de contacto 3-5 veces al día. Cerrar los ojos lentamente para permitir la distribución del colirio en toda la superficie ocular.

En caso de que las molestias empeoren o no mejoren, ¡consulte a su oftalmólogo!



### COMPOSICIÓN

Hialuronato de sodio 0,15 %, dexpanthenol 2 %, cloruro de sodio, fosfato de sodio monobásico, fosfato de sodio dibásico, agua para inyecciones.

### TAMAÑO DE ENVASE

Envase con 10 monodosis de 0,5 mL.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

• No utilizar el producto si el envase monodosis o la bolsa están dañados. • No tocar el ojo con el envase monodosis. • No utilizar en caso de alergia a cualquiera de los ingredientes. • En muy raros casos, la aplicación del colirio puede provocar irritación en ojos muy sensibles. • Para un solo uso; como **Bepanthol® Colirio** no contiene conservantes, debe desecharse toda solución no utilizada inmediatamente después de abrir el envase. • Si está usando otro colirio o pomada ocular, espere unos 15 minutos y aplique a continuación **Bepanthol® Colirio**. • No utilizar en caso de ojos infectados o dañados. • Tras su aplicación, puede experimentarse visión borrosa durante un breve período; evitar conducir vehículos o manejar maquinaria mientras no se recupera la visión normal. • No utilizar el colirio después de la fecha de caducidad que aparece en cada monodosis, bolsa y en el envase. • **Bepanthol® Colirio** contiene tampón fosfato. En el uso a largo plazo y en caso de trastornos funcionales de la córnea, el uso de **Bepanthol® Colirio** provoca la precipitación de sales de calcio en la córnea.

### CONSERVACIÓN

Conservar entre 2°C y 25°C. No congelar. Conservar las bolsas en el envase.

**LOTE** número de lote y  fecha de caducidad marcada en cada envase monodosis.

**ESTÉRIL**  Fabricación estéril

 para un solo uso

 Para la descripción y el modo de empleo ver las instrucciones de uso.

 25° C  
2° C  
Temperatura de conservación

  
Penta Arzneimittel GmbH  
Werkstrasse, 3  
D- 92551 Stulln  
Alemania

Distribuido en España por:  
Bayer Hispania, S.L.  
Av. Baix Llobregat, 3-5  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)  
España

CE 0483

Fecha revisión: 01/2014

Bayer